

روان‌شناسی مرضی و کودکان استثنایی:

۶۶- رایج‌ترین اختلال اضطرابی در دوران کودکی، کدام است؟

(۱) هراس (۲) اضطراب جدایی

(۳) اضطراب فراگیر (۴) وسواس فکری - عملی

۶۷- وقتی آزمایشگر پس از این که کودک رفتاری را انجام داد که برایش لذت بخش نیست، به او فرصت می‌دهد تا

فعالیتی را که دوست دارد انجام دهد، از کدام روش استفاده کرده است؟

(۱) اصل تنبیه (۲) تقویت منفی

(۳) تقویت مثبت (۴) اصل پریماک

- ۶۸- نقایص هسته‌های قاعده‌ای در علت‌شناسی کدام اختلال دوره کودکی و نوجوانی نقش دارد؟
 (۱) وحشت‌زدگی
 (۲) اضطراب جدایی
 (۳) اضطراب فراگیر
 (۴) وسواس فکری - عملی
- ۶۹- واکنش ترس در مقابل غریبه در چند ماهگی رخ می‌دهد؟
 (۱) ۱ - ۴
 (۲) ۳ - ۶
 (۳) ۵ - ۷
 (۴) ۷ - ۱۰
- ۷۰- در تقویت «افتراقی» رفتار، تقویت به چه منظور ارائه می‌شود؟
 (۱) تحقق نیافتن رفتارهای ناپسند
 (۲) تحقق یافتن رفتارهای پسندیده
 (۳) تحقق نیافتن رفتارهای پسندیده
 (۴) تحقق یافتن رفتارهای ناپسند
- ۷۱- وقتی کودکی «سربه‌سر دیگران می‌گذارد یا آزارشان می‌دهد»، این رفتار دربرگیرنده کدام ویژگی اختلال سلوک (CD) است؟
 (۱) خودشیفتگی
 (۲) بی‌رحمی
 (۳) بی‌احساسی
 (۴) تکانشگری
- ۷۲- افسردگی انکایی (Anaclitic Depression) کودکان از دیدگاه اسپینتز، نتیجه کدام عامل است؟
 (۱) خودانتقادی
 (۲) احساس گناه
 (۳) اختلال دلبستگی
 (۴) عزت نفس پایین
- ۷۳- از نظر ملانی کلاین، اضطراب جدایی کودکان نتیجه کدام عامل است؟
 (۱) ویرانگری درونی
 (۲) سرکوب میل
 (۳) ضعف ایگو
 (۴) فرافکنی
- ۷۴- در DSM-5 کدام اختلال دامنه‌ای از اختلالات جدی را در تعامل افراد و رفتارهایی که الگوهای تمایلات و فعالیت فرد را شامل می‌شود، در بر می‌گیرد؟
 (۱) اسپرگر
 (۲) طیف اوتیسم
 (۳) اتیستیک
 (۴) رشد فراگیر
- ۷۵- شایع‌ترین اختلال یا ویژگی بارز در کودکان مبتلا به طیف اوتیسم، کدام است؟
 (۱) خموشی انتخابی
 (۲) اختلال‌های خواب
 (۳) اختلال ارتباط اجتماعی
 (۴) وسواس - بی‌اختیاری
- ۷۶- هدف اصلی و زیربنایی دل‌مشغولی نوجوانان مبتلا به روان بی‌اشتهایی، به ترتیب کدام است؟
 (۱) لاغری - ریاضت‌طلبی
 (۲) لاغری - ترس از چاقی
 (۳) لاغری - ترس از منزوی شدن
 (۴) مبارزه با اضطراب - وسواس درباره چاقی
- ۷۷- شدت بینایی با تصحیح در فرد مبتلا به نابینایی «تقریباً کامل»، چه مقدار است؟
 (۱) کمتر از $\frac{1}{60}$
 (۲) کمتر از $\frac{3}{60}$
 (۳) برابر با $\frac{6}{7.5}$
 (۴) کمتر از $\frac{6}{48}$

- ۷۸- کدام مورد، جزء نشانه‌های اختلال کنش‌پریشی نیست؟
- (۱) نگارش کند و نارسا
(۲) بی‌قراری و شب‌اداری
(۳) مهارت‌های تعادلی آسیب‌دیده
(۴) نقص در مهارت‌های حرکتی ظریف
- ۷۹- در کدام ناهنجاری کروموزومی، اگر ماده ژنتیکی ثابت هم باشد، با بهم خوردن ترتیب آن اثرات جدیدی در ساختمان کروموزوم‌ها به وجود می‌آید؟
- (۱) کمبود
(۲) واژگونی
(۳) جابه‌جایی
(۴) مضاعف‌شدگی
- ۸۰- کدام مورد، از جمله شایع‌ترین علت‌های مشکلات گوش درونی است؟
- (۱) عوامل ارثی
(۲) عوامل محیطی
(۳) عفونت‌های باکتریایی
(۴) عفونت‌های ویروسی
- ۸۱- انقباض غیرارادی ماهیچه‌ها چه نام دارد و در کدام دسته از طبقه‌بندی فلج مغزی قرار می‌گیرد؟
- (۱) آنتوز - حرکتی
(۲) اسپاستیک - حرکتی
(۳) آنتوز - جایگاهی
(۴) اسپاستیک - جایگاهی
- ۸۲- در سندرم X شکننده، کدام معلولیت بارز است؟
- (۱) ناشنوایی
(۲) نابینایی
(۳) کم‌توانی هوشی
(۴) ناشنوایی و نابینایی همزمان
- ۸۳- در کدام نظریه، فرض بر این است که افراد اتیستیک ضعف در پردازش کلی اطلاعات دارند و از یک سبک شناختی متفاوتی بهره می‌برند؟
- (۱) حافظه فعال
(۲) نظریه ذهن
(۳) انسجام مرکزی
(۴) انعطاف‌پذیری ذهنی
- ۸۴- ناپایداری عاطفی، عصبانیت‌های ناگهانی و شدید، آشفتگی در انجام دادن کارها، بی‌ثباتی در روابط بین فردی و پاسخ‌های نامعمول به روان‌درمانی، در نیم‌رخ رفتاری کدام گروه دیده می‌شود؟
- (۱) سلوک
(۲) طیف اوتیسم
(۳) تنظیم خلق‌ایدایی
(۴) نقص توجه/ بیش‌فعالی
- ۸۵- در مدل پردازش اطلاعات، نیم‌رخ شناختی کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی چگونه است؟
- (۱) در درون‌داد اطلاعات در بخش جنبشی مشکل دارند.
(۲) در قسمت برون‌داد اطلاعات، صحبت کردن آسیب دیده است.
(۳) در درون‌داد اطلاعات در بخش دیداری و شنیداری مشکل دارند.
(۴) در قسمت برون‌داد اطلاعات، پاسخ حرکتی و دویدن آسیب دیده است.

روان‌شناسی مرضی و کودکان استثنایی:

- ۵۱- کدام اختلال، در مرحله REM خواب اتفاق می‌افتد؟
(۱) کابوس‌ها (nightmares) (۲) خواب‌گردی‌ها (sleep walking)
(۳) وحشت‌های شبانه (night terrors) (۴) نارکولپسی (narcolepsy)
- ۵۲- کدام مورد، در چهارچوب اختلالات خواب مورد بررسی قرار می‌گیرد؟
(۱) توهم (۲) هذیان (۳) هراس (۴) وحشت‌زدگی

- ۵۳- کدام علامت نشان‌دهنده ناتوانی بیمار در انجام دادن یا تکمیل کردن کارهای هدفمند روزانه است و باعث می‌شود که فرد نسبت به فعالیت‌های اجتماعی یا شغلی، انگیزه بسیار اندکی نشان دهد یا نسبت به آن‌ها کاملاً بی‌تفاوت شود؟
 (۱) بی‌علاقگی احساسی (Flat affect) (۲) بی‌واکنشی هیجانی (Affective flattening)
 (۳) بی‌انگیزگی (Avolition) (۴) فقر حرکتی (Poor activity)
- ۵۴- در نظریه یادگیری «ماورر»، در مورد علت وسواس، عامل اول ایجاد وسواس، براساس کدام فرایندهای شرطی‌سازی عمل می‌کند؟
 (۱) تقابلی (۲) کنشگر (۳) کلاسیک (۴) معنایی
- ۵۵- در کدام روش درمانی فعال‌سازی، متخصص بالینی به درمان‌جوی افسرده کمک می‌کند تا فعالیت‌های مرتبط با خلق مثبت را مشخص کند؟
 (۱) رفتاری (۲) شناختی
 (۳) شناختی - رفتاری (۴) زیستی - رفتاری
- ۵۶- در کدام اختلال، هنگام شنیدن گفتار هیجانی در مناطق مغزی مربوط به خوداندیشی و حساس به موقعیت‌های اجتماعی، فعال‌سازی بیشتری مشاهده می‌شود؟
 (۱) افسردگی (۲) اضطراب اجتماعی (۳) وسواس فکری (۴) اسکیزوفرنی
- ۵۷- در آسیب‌شناسی روانی، محدودیت اصلی «مطالعه موردی» کدام است؟
 (۱) دشواری در پیدا کردن بیمارانی که مشابه یکدیگر باشند.
 (۲) دشواری تعمیم نتایج به افرادی که مشکلات مشابه دارند.
 (۳) دشواری در پیدا کردن افرادی که منحصر به فرد باشند.
 (۴) دشواری در جلب رضایت بیمار که برای مطالعه عمیق در نظر گرفته می‌شود.
- ۵۸- کدام گروه از اختلالات، جزء اختلالات «برون نمود» محسوب می‌شوند؟
 (۱) اضطراب جدایی - هراس اجتماعی - وسواس اجباری (۲) وحشت‌زدگی - افسردگی اساسی - افسرده‌خویی
 (۳) بیش‌فعالی - نافرمانی مقابله‌ای - سلوک (۴) اضطراب تعمیم‌یافته - هراس خاص - افسردگی خفیف
- ۵۹- براساس کدام الگو (مدل)، افراد با زمینه‌ای متولد می‌شوند که آن‌ها را در معرض خطر ابتلا به اختلال روانی قرار می‌دهد؟
 (۱) بیماری‌پذیری ارثی - استرس (۲) زیست‌شناختی
 (۳) روان‌شناختی (۴) رفتاری
- ۶۰- آزمون رورشاخ، از کدام نوع آزمون‌های فرافکن محسوب می‌شود؟
 (۱) اندریافت (۲) تداعی (۳) شناختی (۴) ادراکی
- ۶۱- آزمایش آپگار در چه زمانی پس از تولد انجام می‌شود و شامل کدام مؤلفه‌ها است؟
 (۱) دقیقه‌های اول، دهم و سی‌ام - فعالیت کودک، ضربان قلب، رنگ ظاهر، رفلکس‌ها، واکنش‌های پوستی
 (۲) دقیقه‌های اول و پنجم - ضربان قلب، میزان تنفس، قدرت ماهیچه‌ها، وضعیت عمومی، رنگ پوست
 (۳) دقیقه‌های اول، دهم و سی‌ام - فعالیت کودک، ضربان قلب، تنفس، رفلکس‌ها، واکنش‌های پوستی
 (۴) دقیقه‌های اول و پنجم - نبض، رفلکس‌ها، رنگ پوست، تنوس عضلانی، واکنش‌های پوستی
- ۶۲- در کدام شکل ژنتیکی از سندرم داون که نزدیک به ۴۰ درصد از موارد اختلال هوشی - تحولی متوسط و شدید را در بر می‌گیرد، یک نسخه اضافی ۲۱ بر اثر عدم انفصال کروموزومی ایجاد می‌شود؟
 (۱) جابه‌جایی رابرت سوفین (۲) موزائیک
 (۳) تریزومی جزئی ۲۱ (۴) تریزومی ۲۱

- ۶۳- واحد اصلی بریل یک سلول چند گوشه می‌باشد و شامل چند نقطه است؟
 (۱) سه - یک تا چهار
 (۲) چهار - یک تا شش
 (۳) شش - شش
 (۴) چهار - هشت
- ۶۴- کدام مورد در مفهوم‌سازی تیزهوشی از نظر رنزولی، وجود ندارد؟
 (۱) توانایی بالا
 (۲) تعهد بالا نسبت به تکلیف
 (۳) توانایی تحلیل یک مسئله
 (۴) خلاقیت بالا
- ۶۵- هراس در بین کدام گروه از دانش آموزان زیر، شیوع بیشتری دارد؟
 (۱) تیزهوش
 (۲) اختلال اتیسم
 (۳) کم‌توانی ذهنی
 (۴) اختلال ADHD
- ۶۶- نارسایی‌های زبان دریافتی، از کدام نوع نارسایی‌های پردازشی است؟
 (۱) دیداری
 (۲) حسی
 (۳) شنیداری
 (۴) اطلاعات
- ۶۷- کدام مورد، اصلی‌ترین مشکل افراد مبتلا به نشانگان پرادر - ویلی است؟
 (۱) پرخوری
 (۲) لجبازی
 (۳) وسواسی
 (۴) پرخاشگری
- ۶۸- وجود تأخیر در رشد زبان، بیش‌فعالی، اختلالات خلقی و گوش‌های برجسته، از ویژگی‌های کدام اختلال است؟
 (۱) کلاین فلتز
 (۲) ترنر
 (۳) سندرم داون
 (۴) سندرم X شکننده
- ۶۹- ناتوانی در تشخیص و کاربرد صداها چه نام دارد؟
 (۱) نارسایی در حساب
 (۲) نارسانویسی
 (۳) نارساخوانی
 (۴) اختلال زبان شفاهی
- ۷۰- در کدام روش درمان، اختلال خواندن بر آموزش روابط بین حروف و اصوات زبانی مربوطه تأکید می‌شود؟
 (۱) آوایی
 (۲) کل‌نگر
 (۳) تکلیف‌نگر
 (۴) معنائگر

روان‌شناسی مرضی و کودکان استثنایی:

- ۵۱- چنانچه فردی بیش از یک شخصیت را با خودپنداره مربوط به خودش پرورش دهد، به کدام اختلال مبتلا است؟
- (۱) هویت تجزیه‌ای
(۲) مسخ شخصیت
(۳) شخصیت نمایشی
(۴) مسخ واقعیت
- ۵۲- شخصی که خودبیمارانگاری (هیپوکندری) دارد، از کدام مکانیسم دفاعی به صورت برجسته استفاده می‌کند؟
- (۱) انکار (۲) جداسازی (۳) دلیل تراشی (۴) همانندسازی
- ۵۳- وظیفه کدام نوع حافظه این است که اطلاعات را در حافظه کوتاه‌مدت نگه دارد و با تحلیل آن‌ها اطلاعات سودمند را شناسایی کند و برای حل مشکلاتی که در آینده پیش خواهد آمد، مورد استفاده قرار دهد؟
- (۱) بلندمدت (۲) کاری (۳) سرگذشتی (۴) ضمنی
- ۵۴- کدام نوع پرخاشگری در دختران بیشتر از پسران است؟
- (۱) ابزاری (۲) خصمانه (۳) دفاعی (۴) رابطه‌ای
- ۵۵- کدام تحلیل است که برای تشخیص دقیق رفتار نامطلوب کودک، تشخیص پیشایندهای محیطی که بلافاصله پیش از رفتار می‌آیند و تشخیص رویدادهای محیطی که بلافاصله بعد از رفتار می‌آیند و احتمال دارد رفتار را حفظ کند، مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- (۱) بنیادی (۲) کارکردی (۳) محتوا (۴) فرایند
- ۵۶- نتیجه تحقیق معروف درخصوص چهار قله‌های دارای نشانه‌های اختلال اسکیزوفرنی (جینائین) بیانگر اهمیت کدام عامل است؟
- (۱) نقایص ژنتیکی و وراثتی
(۲) محیط آشفته خانواده
(۳) دوران تحول و رشد
(۴) تعامل پیچیده ژنتیک و محیط

- ۵۷- طبق نظر راجمن، مهم‌ترین علت روان‌شناختی افراد با علائم OCD کدام است؟
- (۱) سرکوب افکار مزاحم (Rebound effect)
 - (۲) نقصان حافظه کوتاه‌مدت (Memory Deficits)
 - (۳) آمیختگی فکر و عمل (Thought action fusion)
 - (۴) احساس مسئولیت افراطی (Inflated Responsibility)
- ۵۸- هنگامی که افراد عمدتاً با نشانه‌های جسمانی از قبیل تپش قلب، تنگی نفس مواجهه می‌شوند اولین تشخیص کدام اختلال اضطرابی است؟
- (۱) وحشت‌زدگی
 - (۲) اضطراب فراگیر
 - (۳) اختلال استرس پس از ضربه
 - (۴) وسواس فکری - عملی
- ۵۹- در درمان‌های فراشناختی، اختلالاتی از قبیل اضطراب و افسردگی، به دلیل نقص و نارسایی در کدام لایه و بخش از شخصیت افراد بروز پیدا می‌کند؟
- (۱) A - محرک‌ها و برانگیزاننده‌های محیطی
 - (۲) C - پیامدهای هیجانی و رفتاری افراد
 - (۳) B - فراشناخت‌ها و باورهای غیرمنطقی افراد
 - (۴) M - باورهای فراشناختی و سندروم شناختی - توجهی
- ۶۰- مدت زمان لازم برای تشخیص‌گذاری اختلال آزارگری جنسی کودکان حداقل چند ماه است؟
- | | | | |
|-------|-------|-------|--------|
| (۱) ۴ | (۲) ۶ | (۳) ۸ | (۴) ۱۲ |
|-------|-------|-------|--------|
- ۶۱- نخستین واکنش خانواده در برابر تولد نوزاد معلول کدام است؟
- (۱) پذیرش کودک
 - (۲) درک کردن
 - (۳) ضربه روحی
 - (۴) عقب‌نشینی دفاعی
- ۶۲- مهم‌ترین وظیفه و مسئولیت والدین کودکان معلول در سال‌های اولیه زندگی کودک کدام است؟
- (۱) تعامل با متخصصان و معلمان ذی‌ربط
 - (۲) یافتن برنامه مداخله‌ای مناسب برای کودک
 - (۳) تأمین بهزیستی و مراقبت‌های لازم از کودک معلول
 - (۴) کمک به اعضای خانواده برای افزایش درک و فهم آنان درباره معلولیت
- ۶۳- مهم‌ترین مشکل خانواده‌های کودکان عقب‌مانده ذهنی کدام است؟
- (۱) آماده‌کردن محیط خانواده برای قبول و پذیرش کودک.
 - (۲) نگرانی درباره این‌که کودک هرگز به خودکفایی لازم نرسد.
 - (۳) نگرانی درباره هزینه‌های گزاف نگهداری و مراقبت از کودک.
 - (۴) تصمیم‌گیری درباره نگهداری کودک در منزل یا مؤسسه حمایتی.
- ۶۴- کدام مورد در تعریف کودکان با اختلالات رفتاری، نادرست است؟
- (۱) به‌طور دائم کشمکش‌های اجتماعی دارند.
 - (۲) به‌طور دائم برای خودشان مشکل می‌آفرینند.
 - (۳) معمولاً رفتار مناسب با سن را نشان می‌دهند.
 - (۴) با ناراحتی‌های شخصی و شکست تحصیلی روبه‌رو می‌شوند.

۶۵- در بین عارضه‌های ژنتیک که به معلولیت ذهنی منجر می‌شود، کدام سندرم بالاترین شیوع را به خود اختصاص داده است؟

(۱) داون (۲) ویلیامز (۳) پاتو (۴) ادوارد

۶۶- به‌طور معمول نشانه‌های اختلال طیف درخودماندگی در چند سالگی بروز می‌یابد؟

(۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

۶۷- رایج‌ترین اختلال گفتاری کدام است؟

(۱) تولید (۲) سیالی (۳) صدا (۴) کاربرد

۶۸- اختلال‌هایی که مربوط به زیر و بمی، بلندی و کیفیت صدای افراد است چه نامیده می‌شوند؟

(۱) اختلال روانی کلامی (۲) اختلال تولیدی (۳) لکنت زبان (۴) اختلال آوایی

۶۹- علاقه نداشتن برای بازی با معماها، مکعب‌ها، ساختن مدل‌ها و مانند آن، بیشتر نشان‌دهنده کدام نارسایی در کودکان است؟

(۱) فقدان آمادگی ذهنی (۲) اختلال در ادراک فضایی

(۳) عملکرد پایین هوش غیرکلامی (۴) اختلال در تشخیص و درک بینایی

۷۰- هنگامی که والدین معلولیت عمده کودک خود را ناچیز شمرده و امید به بهبودی آن را با گذشت زمان دارند، نشانه کدام واکنش است؟

(۱) احساس گناه (۲) احساس خشم (۳) انکار واقعیت (۴) پذیرش کودک

روان‌شناسی مرضی و کودکان استثنایی:

- ۵۱- براساس دیدگاه هستی‌گرایی علت رفتار ناپه‌نچار کدام است؟
- (۱) انتخاب غیرمعقول
(۲) باورهای غیرمنطقی
(۳) ناتوانی در مقابله با فشارهای روانی
(۴) ناهمخوانی خودپنداری با تجارب شخصی
- ۵۲- علت بیماری پارکینسون به نقص در کدام قسمت مغز مرتبط است؟
- (۱) سیستم لیمبیک
(۲) عقده‌های پایه
(۳) هیپوکامپ
(۴) بادامه و ناحیه جداری
- ۵۳- براساس کدام مورد، بیماران مبتلا به اختلال هذیانی از بیماران اسکیزوفرنیک تفکیک می‌شوند؟
- (۱) وجود توهمات بارز در اختلال هذیانی
(۲) فقدان بی‌تفاوتی عاطفی در اسکیزوفرنی
(۳) غرابت هذیان‌ها در اختلال هذیانی
(۴) غرابت هذیان‌ها در اسکیزوفرنی
- ۵۴- در کدام طبقه‌بندی فرض بر این است که «همه پدیده‌هایی که باید طبقه‌بندی شوند، می‌توانند در طبقه‌هایی کاملاً متمایز قرار گیرند»؟
- (۱) ابعادی
(۲) بیماری‌شناختی
(۳) ریخت‌شناختی
(۴) مقوله‌ای
- ۵۵- الگوی رفتاری که شامل نقض حقوق دیگران است و همراه با پرخاشگری فیزیکی، خسارت به اموال دیگران، دزدی و دروغ‌گویی می‌باشد، جزء کدام اختلال محسوب می‌شود؟
- (۱) فراگیر رشد
(۲) نافرمانی مقابله‌ای
(۳) سلوک
(۴) نقص توجه / بیش‌فعالی

- ۵۶- نواحی مغزی درگیر در اختلال نارسایی توجه / بیش‌فعالی کدامند؟
(۱) لوب‌های پری فرونتال و فرونتال، هسته دمدار، لگوبوس پالیدوس
(۲) لوب پس‌سری، عقده‌های پایه، هسته دمدار، لگوبوس پالیدوس
(۳) لوب گیجگاهی، هسته دمدار، لوب فرونتال، مخچه
(۴) لوب فرونتال، مخچه، لوب پس‌سری، عقده‌های پایه
- ۵۷- «سردرگمی‌ها و تحریف‌ها در خودپندارهٔ اساسی فرد» از ویژگی کدام اختلال است؟
(۱) ضداجتماعی
(۲) اسکیزوتایپی
(۳) اسکیزوئید
(۴) مرزی
- ۵۸- کدام اختلال بیشتر از سایر اختلالات در افرادی رخ می‌دهد که مشکلاتی در رابطه با مصرف مواد دارند؟
(۱) افسردگی اساسی
(۲) اسکیزوفرنی
(۳) ادواری خوبی
(۴) دوقطبی
- ۵۹- کدام نوع پژوهش، روش قدرتمندی برای ارزیابی آثار رویدادها بر ایجاد آسیب روانی است؟
(۱) الگوی آزمایشگاهی
(۲) زمینه‌یابی
(۳) طولی واپس‌نگرانه
(۴) همبستگی
- ۶۰- نوع تحریف شناختی در موقعیت زیر کدام است؟
«تنها وقایعی که فرد جدی می‌گیرد، آن‌هایی هستند که بیانگر شکست، محرومیت، فقدان یا ناکامی هستند».
(۱) ارجاع دادن مفرط به خود
(۲) انتزاع‌گریشی
(۳) تفکر دو مقوله‌ای
(۴) فاجعه‌آمیز کردن
- ۶۱- فردی که آستانه شنوایی او ۷۰-۸۹ دسی‌بل است از نظر نقص شنوایی در کدام طبقه قرار می‌گیرد؟
(۱) خفیف
(۲) متوسط
(۳) عمیق
(۴) شدید
- ۶۲- کدام مورد، علت عمده افت شنوایی در کودکان است؟
(۱) زودرسی
(۲) عفونت‌های ویروسی
(۳) عوامل ژنتیکی
(۴) کم‌اکسیژنی هنگام تولد
- ۶۳- طبق دیدگاه دانشمندان، «لفظ‌گیری یا ناواقعیتی کلامی» در کدام گروه از دانش‌آموزان ملاحظه می‌شود؟
(۱) نابینا
(۲) ناشنوا
(۳) درخودمانده
(۴) دارای اختلال یادگیری
- ۶۴- در کدام نوع از فلج مغزی، باها بیشتر از دست‌ها درگیر هستند؟
(۱) همی‌پلژیا
(۲) کوادری‌پلژیا
(۳) دی‌پلژیا
(۴) پاراپلژیا
- ۶۵- «مشکلات تعادلی، ادراک ضعیف عمق و ضعف در مهارت‌های حرکتی ظریف و درشت» از ویژگی‌های کدام نوع فلج مغزی است؟
(۱) آتاکسیک
(۲) آتوتوئید
(۳) اسپاستیک
(۴) آمیخته

-
- ۶۶- باقی‌ماندن کدام بازتاب بعد از ۳ سالگی، احتمال اختلال در سیستم عصبی را نشان می‌دهد؟
(۱) باننسکی
(۲) گردن
(۳) لایبرنتی
(۴) مورو
- ۶۷- کدام اختلال، درباره شیوع لکنت زبان براساس جنسیت درست است؟
(۱) در دختران بیشتر از پسران است.
(۲) در پسران بیشتر از دختران است.
(۳) شیوع لکنت زبان، در هر دو جنس برابر است.
(۴) شواهد پژوهشی کافی در این زمینه وجود ندارد.
- ۶۸- کدام اختلال، رایج‌ترین مشکل دانش‌آموزان با اختلال‌های ارتباطی است؟
(۱) تلفظی
(۲) تحولی
(۳) سیالی
(۴) صدا
- ۶۹- از نظر «بارکلی»، کدام مورد مهم‌ترین مشکل افراد دارای اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی (ADHD) است؟
(۱) مهارت‌های ارتباطی
(۲) مهارت‌های عمومی
(۳) رفتار سازشی
(۴) آگاهی و مدیریت زمان
- ۷۰- مدل «عامل چرخان» توسط رنزولی و همکارانش برای کدام گروه از دانش‌آموزان استثنایی پیشنهاد شد؟
(۱) تیزهوشان
(۲) نابینایان
(۳) ناشنوایان
(۴) معلولان جسمی

روان‌شناسی مرضی و کودکان استثنایی:

- ۵۱- کدام یک از اختلالات خواب در مرحله REM خواب اتفاق می‌افتند؟
- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| (۱) خواب‌گردی‌ها (sleep walking) | (۲) کابوس‌ها (night mares) |
| (۳) وحشت‌های شبانه (night terrors) | (۴) نارکولپس‌ها (narcolepsy) |

- ۵۲- در کدام یک از انواع یادزدودگی فرد هم گذشته نزدیک و هم دور خود را از دست می‌دهد؟
 (۱) پس‌گستر
 (۲) پس از سانحه
 (۳) تجزیه‌ای
 (۴) عضوی
- ۵۳- کدام اختلال عبارت است از تغییر مستمر و عودکننده ادراک شخص از خود به طوری که احساس واقعیت خود موقتاً از بین می‌رود؟
 (۱) خواب‌واره تجزیه‌ای
 (۲) گریز تجزیه‌ای
 (۳) مسخ شخصیت
 (۴) هویت تجزیه‌ای
- ۵۴- شخصیت صرعی، برای توصیف وضعیت روانی کدام اختلال به کار برده می‌شود؟
 (۱) انفجاری متناوب
 (۲) شخصیت ضد اجتماعی
 (۳) شخصیت پرخاشگری
 (۴) سلوک
- ۵۵- حداقل سن برای تشخیص بی‌اختیاری ادرار باید چند سال باشد؟
 (۱) ۶
 (۲) ۵
 (۳) ۴
 (۴) ۳
- ۵۶- در کودکان ADHD، احتمال نقص عملکرد کدام یک از مناطق مغزی مطرح شده است؟
 (۱) جسم پینه‌ای
 (۲) سیستم لیمبیک
 (۳) لوب پیشانی
 (۴) هیپوکامپ
- ۵۷- عاملی که احتمال پیامدهای منفی را صرفاً در حضور یک عامل منفی دیگر افزایش می‌دهد، اصطلاحاً چه نامیده می‌شود؟
 (۱) عامل خطر
 (۲) عامل زمینه‌ساز
 (۳) عامل آشکارساز
 (۴) عامل آسیب‌پذیری
- ۵۸- مفهوم روانکاوی «مادر به‌قدر کافی خوب»، در تبیین سبب‌شناسی کدام یک از اختلالات آمده است؟
 (۱) افسردگی
 (۲) انطباقی
 (۳) استرس پس از سانحه
 (۴) پس‌کوز واکنشی گذرا
- ۵۹- در نشانگان مونچهاوزن یا اختلال ساختگی، هدف فرد کدام است؟
 (۱) کسب توجه پزشکی
 (۲) جلب توجه اطرافیان
 (۳) هدف آشکاری ندارد
 (۴) نفع ثانوی در محیط کار
- ۶۰- از نظر کورت‌اشنایدر، فقدان علائم درجه اول برای اسکیزوفرنی به کدام معنا است؟
 (۱) وجود اسکیزوفرنی
 (۲) عدم وجود اسکیزوفرنی
 (۳) احتمال زیاد برای تشخیص اسکیزوفرنی
 (۴) احتمال کم برای تشخیص اسکیزوفرنی
- ۶۱- اتیسم معمولاً تا پیش از چندسالگی آشکار می‌شود؟
 (۱) ۱ سالگی
 (۲) ۲ سالگی
 (۳) ۳ سالگی
 (۴) ۴ سالگی
- ۶۲- کدام اختلال، به‌عنوان رایج‌ترین اختلال روانی عصبی دوره کودکی شناخته شده است؟
 (۱) سلوک
 (۲) رشدی کودکی
 (۳) رفتار مقابله‌جویانه
 (۴) نارسایی توجه - فزون‌کنشی

۶۳- لرزش‌های غیرارادی و حرکات غیرارادی پیچشی بدن به خصوص در بازوها، گردن و سر از ویژگی کدام یک از انواع

فلج مغزی است؟

- (۱) آتوئید
(۲) اسپاستیک
(۳) اتاکسیک
(۴) ترمور

۶۴- بیماری فنیل کتونوری، کدام است؟

- (۱) یک اختلال مربوط به غدد داخلی بوده و عقب‌ماندگی ذهنی متوسط ایجاد می‌کند.
(۲) یک اختلال مربوط به سوخت‌وساز مواد فنیدی بوده و عقب‌ماندگی ذهنی ایجاد نمی‌کند.
(۳) یک اختلال مربوط به سوخت‌وساز چربی‌ها بوده و عقب‌ماندگی ذهنی خفیف ایجاد می‌کند.
(۴) یک اختلال مربوط به سوخت‌وساز مواد پروتئینی بوده و باعث عقب‌ماندگی ذهنی شدید می‌شود.

۶۵- کدام یک در مورد سندرم کلاین فلتز درست است؟

- (۱) مخصوص زن‌ها به‌علت داشتن یک کروموزوم جنسی X زیادتر از معمول
(۲) مخصوص زن‌ها به‌علت داشتن یک کروموزوم جنسی Y زیادتر از معمول
(۳) مخصوص مرد‌ها به‌علت داشتن یک کروموزوم جنسی X زیادتر از معمول
(۴) مخصوص مرد‌ها به‌علت داشتن یک کروموزوم جنسی Y زیادتر از معمول

۶۶- فیبروز کیستی، چه نوع بیماری است؟

- (۱) تنفسی
(۲) حسی
(۳) حرکتی
(۴) مغزی

۶۷- شیوع دانش آموزان با کم‌توانی ذهنی از کدام یک از گروه دانش‌آموزان با نیازهای ویژه که در ذیل آمده، کم‌تر است؟

- (۱) با آسیب‌های بینایی
(۲) با اختلال‌های یادگیری
(۳) با آسیب‌های شنوایی
(۴) با معلولیت جسمی - حرکتی

۶۸- اختلال کمبود توجه - بیش‌فعالی، توسط کدام یک از پیشگامان معرفی شده است؟

- (۱) استیل
(۲) ایتارد
(۳) پینل
(۴) کرک

۶۹- بارزترین تفاوت اختلال‌های نافرمانی مقابله‌ای و سلوک، شامل کدام مورد است؟

- (۱) میزان شیوع کمتر نافرمانی مقابله‌ای در پسران نسبت به دختران
(۲) اختلال نافرمانی مقابله‌ای نسبت به اختلال سلوک نیاز به درمان طولانی‌تری دارد.
(۳) میزان شیوع متفاوت و تمایل به پرخاشگری کمتر در دانش‌آموزان با اختلال سلوک
(۴) سن بروز متفاوت و تمایل کمتر کودکان نافرمان به پرخاشگری نسبت به کودکان با اختلال سلوک
۷۰- وقتی برای اولین بار کودکی تشخیص ناتوانی شدید دریافت می‌کند، کدام مورد عاطفه والدین او است؟

- (۱) خشم
(۲) گناه
(۳) شوک
(۴) ناکامی

روان‌شناسی مرضی و کودکان استثنایی:

- ۵۱- چند درصد از کم‌توانی‌های ذهنی، ناشی از علل ژنتیکی است؟
 (۱) ۱۰۰ (۲) ۲۵ (۳) ۵۰ (۴) ۷۵
- ۵۲- دو علامت خیره شدن و توقف در فعالیتی که در حال انجام است (مانند نوشتن)، از علائم بارز کدام صرع است؟
 (۱) بزرگ (۲) کوچک (۳) گیجگاهی (۴) میوکلونیک
- ۵۳- سوء تعبیر علائم جسمی، از ویژگی‌های کدام اختلال است؟
 (۱) بدنی‌سازی (۲) بدشکلی بدن (۳) تبدیلی (۴) خودبیمار پنداری
- ۵۴- کودکان معمولاً در دوران شیرخوارگی چیزهای مختلف را به دهان می‌برند لکن بعد از یک سن خاص، این عمل غیرطبیعی بوده و اصطلاح آن پیکا (Pica) یا هرزه‌خواری نامیده می‌شود. این رفتار معمولاً در چه سنی اتفاق می‌افتد؟
 (۱) ۶ ماهگی (۲) ۱ سالگی (۳) ۱٫۶ سالگی (۴) ۲ سالگی
- ۵۵- کدام یک از نشانگان زیر از متداول‌ترین شرایط ارثی ایجادکننده ناشنوایی - نابینایی است؟
 (۱) ایکس شکننده (۲) پرادر - ویلی (۳) ویلیامز (۴) آشر
- ۵۶- در اختلال‌های تغذیه‌ای کودکان به «اختلال نشخوار»، اشاره می‌شود. این اختلال با کدام علائم مشخص می‌شود؟
 (۱) پرخوری غذا
 (۲) برگرداندن (بالا آوردن) غذا
 (۳) فرو بردن یا بلعیدن مکرر غذا
 (۴) برگرداندن (بالا آوردن) و مجدداً فرو دادن (بلعیدن) غذا
- ۵۷- براساس نتایج اغلب تحقیقات، علت عمده‌ی اختلال اتیسم کدام است؟
 (۱) محیطی (۲) عاطفی
 (۳) عصب شناختی (۴) مشکل یزشکی مادر در دوران بارداری
- ۵۸- علت کدام بیماری، مشکل در سوخت و ساز اسید آمینه تریپتوفان (tryptophan) است؟
 (۱) بیماری لو (Lowe) (۲) بیماری گشر (Gaucher)
 (۳) بیماری گارگوی لیسم (Gargoylism) (۴) هارت ناپ (Hartnup)
- ۵۹- ویژگی مشترک و اصلی تمام اختلال‌های طیف اتیسم، در کدام مهارت است؟
 (۱) اجتماعی (۲) حرکتی (۳) شناختی (هوشی) (۴) زبانی
- ۶۰- در DSM-5 وجود کدام نشانه برای تشخیص اسکیزوفرنیا حذف شده است؟
 (۱) هذیان‌ها (۲) توهمات شنوایی
 (۳) گفتار آشفته (۴) توهمات درجه اول شنایدری
- ۶۱- اختلال کج خلقی (دیس تایمیا) در DSM-5، با چه عنوان جدیدی نامگذاری شده است؟
 (۱) بدتنظیمی خلق (۲) افسردگی مزمن
 (۳) افسردگی پایدار (۴) افسردگی اساسی
- ۶۲- کدام مدل، تبیین می‌کند که چرا برخی از افراد در مواجهه با فشارهای روانی جزئی، مسائل جدی روانی پیدا می‌کنند و دیگری نیز هستند که حتی با فشار روانی شدیدتر از آن هم مشکلی پیدا نمی‌کنند؟
 (۱) آسیب‌پذیری روانی در برابر استرس (۲) تقلیل‌گرایی زیستی
 (۳) شناختی (۴) رفتاری

- ۶۳- بیماری که می‌تواند همه قسمت‌های دیداری را ببیند، ولی اشیایی که می‌بیند برایش هیچ معنایی نمی‌دهد، دارای کدام اختلال و در کدام ناحیه مغز است؟
 (۱) کوری روانی - پس سری
 (۲) ادراک پریشی دیداری - گیجگاهی
 (۳) حرکت پریشی دیداری - پس سری
 (۴) نابینایی جنبشی قشری - آهیانه‌ای
- ۶۴- کدام نشانه، از ویژگی‌های نشانگان شارژ است؟
 (۱) مشکلات رفتاری
 (۲) ناهنجاری‌های تناسلی
 (۳) نقص در مهارت‌های زبانی
 (۴) نقص در مهارت‌های اجتماعی
- ۶۵- کدام مورد، متداول‌ترین نوع نارسایی بینایی است؟
 (۱) مشکلات مربوط به عضله چشم
 (۲) مشکلات ساختارهای گیرنده چشم
 (۳) اختلال‌های انکساری
 (۴) اختلال رنگ در شبکیه
- ۶۶- براساس مدل بارکلی، عامل اصلی در تبیین اختلال نارسایی توجه - بیش‌فعالی کدام است؟
 (۱) بازداری رفتاری
 (۲) کنش‌های اجرایی
 (۳) مدیریت زمان
 (۴) رفتارهای هدف محور پایدار
- ۶۷- کدام مورد، از ویژگی‌های نشانگان داون محسوب می‌شود؟
 (۱) در حافظه‌ی کوتاه مدت شنیداری نسبت به دیداری قوی‌ترند.
 (۲) عملکرد بهتری در تکالیف کلامی نسبت به تکالیف غیر کلامی دارند.
 (۳) در حافظه‌ی کوتاه مدت دیداری نسبت به شنیداری قوی‌ترند.
 (۴) عملکرد بهتر در تکالیف شنیداری نسبت به تکالیف دیداری دارند.
- ۶۸- براساس نتایج تحقیقات مختلف، حداقل ۶۰ درصد از نقایص شنوایی حسی - عصبی متوسط تا عمیق که پیش از اکتساب زبان رخ می‌دهند، ناشی از کدام عامل است؟
 (۱) ژنتیکی
 (۲) عفونت‌های ویروسی
 (۳) ویروس سایتومگال مادرزادی
 (۴) نارس بودن نوزاد و کم‌وزنی به هنگام تولد
- ۶۹- علت بیماری فنیل کتونوریا (Phenylketonuria)، همراه با ناتوانی هوشی بیانگر مشکل در کدام نوع سوخت و ساز است؟
 (۱) قندها
 (۲) اسیدآمینو
 (۳) مواد معدنی
 (۴) چربی‌ها
- ۷۰- رسوب املاح آهن ناشی از خراب شدن گلوبول‌های قرمز در مغز تحت عنوان کدام بیماری نامگذاری شده است؟
 (۱) مننژیت
 (۲) کرنیکتروس
 (۳) تصلب شرایین
 (۴) توکسوپلاسموزیس

روان شناسی مرضی و کودکان استثنایی

- ۵۱- کدام باور غلط در افراد مبتلا به OCD وجود دارد؟
 (۱) محتمل بودن رویداد، از مسئولیت انسان به شدت کم می‌کند.
 (۲) پیش‌گیری نکردن از آسیب احتمالی به دیگران، جرم نیست.
 (۳) فکرکردن درباره‌ی یک کار، مثل انجام دادن آن کار است.
 (۴) انسان نباید عمداً سعی کند بر افکار خود کنترل داشته باشد.
- ۵۲- دی بریفینگ به چه معناست؟
 (۱) گزارش پسیکولوژیک سریع و بلافاصله پس از تروما
 (۲) پیشگیری از ایجاد PTSD از طریق رفتار درمانی
 (۳) درمان OCD از طریق غرقه سازی یا رفع حساسیت
 (۴) رودر رو قرار دادن بیمار با رویداد مربوط به تروما
- ۵۳- طبق تعریف DSM-5، ویژگی اصلی اختلال روانی کدام است؟
 (۱) وجود نابسامانی در زندگی روزمره‌ی شخصی و اجتماعی
 (۲) رنج بردن از زندگی و داشتن معلولیت در حواس
 (۳) ایجاد اختلال در گفتار و برقراری رابطه با خودی‌ها
 (۴) رنج معلولیت، نابسامانی و نقص در هیجان‌های اجتماعی
- ۵۴- ویژگی کودکان مبتلا به لالی انتخابی (Elective mutism) کدام است؟
 (۱) سابقه رشد زبان طبیعی
 (۲) سابقه رشد زبان غیر طبیعی
 (۳) سابقه رشد زبان به دلیل آسیب مغزی غیر طبیعی است.
 (۴) رشد زبان طبیعی تا سه سالگی و سپس حالت غیر طبیعی
- ۵۵- بیش‌ترین شکایت بیماران افسرده از کدام حالت است؟
 (۱) کاهش میل جنسی
 (۲) میل به خودکشی
 (۳) کاهش انرژی
 (۴) اختلال خواب
- ۵۶- مشکل در برقراری ارتباط‌های اجتماعی، بازی‌های غیر هدفمند، ناهماهنگی حرکتی، خودداری از انجام بعضی کارها و گستره‌ی توجه کم، از ویژگی‌های کدام کودکان است؟
 (۱) ناتوانی ذهنی
 (۲) ناتوانی حرکتی
 (۳) اختلال اوتیسم
 (۴) مشکل ناهماهنگی رشدی
- ۵۷- بر اساس نظریه‌ی روان تحلیل‌گری، کدام علامت با تعارض ناخودآگاه بیمار، رابطه‌ای نمادین دارد؟
 (۱) بی‌تفاوتی عاطفی
 (۲) انسداد کلامی
 (۳) نفع اولیه
 (۴) تبدیلی
- ۵۸- تشخیص افتراقی اختلال ساختگی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی بر اساس کدام ویژگی صورت می‌گیرد؟
 (۱) فقدان روابط نزدیک در اختلال ساختگی
 (۲) منش خصمانه در اختلال شخصیت ضد اجتماعی
 (۳) تمایل به اعمال تشخیص تهاجمی در اختلال ساختگی
 (۴) تمایل به دروغ‌گویی بیمارگونه در اختلال شخصیت ضد اجتماعی
- ۵۹- تحریک سیستم لمبیک و قشر گیجگاهی منجر به کدام رفتار می‌شود؟
 (۱) افزایش افسردگی
 (۲) کاهش افسردگی
 (۳) کاهش ترس و پرخاشگری
 (۴) افزایش ترس و پرخاشگری
- ۶۰- مبتلایان به کدام اختلال شخصیت، خود را آدم‌های خاصی می‌پندارند و انتظار دارند؛ به‌طور خاصی با آنان مدارا شود. تحمل انتقاد را ندارند و از این‌که کسی جرأت می‌کند از آنان انتقاد کند، دچار خشم می‌شوند؟
 (۱) پارانوئید
 (۲) خود شیفته
 (۳) نمایشی
 (۴) مرزی
- ۶۱- اگر از کودک بخواهیم یکی از حروف صفحه را جدا کند و بشمارد، کدام‌یک از فرآیندها را اندازه‌گیری کرده‌ایم؟
 (۱) دقت
 (۲) ادراک
 (۳) رمز گردانی
 (۴) معنایابی

روان شناسی مرضی و کودکان استثنایی

- ۶۲- عدم دفع یا دفع ناقص مایع مغزی نخاعی از کدام بطن، علت بیماری هیدروسفالی همراه با ناتوانی ذهنی است؟
 (۱) بطن اول (۲) بطن دوم (۳) هر کدام از بطن‌ها (۴) بطن سوم و چهارم
- ۶۳- در کدام نوع ارزشیابی، ارزشیابی توسط معلم کودک و نه توسط روان‌شناس و دیگر ارزیابان صورت می‌گیرد؟
 (۱) فرآیندی (۲) تکوینی (۳) مقطعی (۴) ساختار یافته
- ۶۴- در رشد صفات جنسی زنانه افراد مبتلا به سندرم کلاین فلتر (Kline felter) کدام هورمون بیش از حد ترشح می‌شود؟
 (۱) FSH (۲) TSH (۳) Tyrosine (۴) Phenylalanine
- ۶۵- اختلال در کروموزوم شماره ۱۵ منجر به کدام یک از نشانگان می‌شود؟
 (۱) ویلیامز (۲) ایکس شکننده (۳) صدای گربه (۴) پرادر - ویلی
- ۶۶- انجام تست کلروفریک برای تشخیص کدام بیماری است؟
 (۱) کاف (kuf) (۲) فنیل کتونوریا (۳) سربروماکولار نوجوانی (۴) نیمن پیک (NimanPick)
- ۶۷- علت بیماری گالاکتوسمی کدام عامل است؟
 (۱) نقص در یکی از کروموزوم‌ها (۲) ترشح خیلی کم تیروکسین (۳) فقدان یا نارسایی نوعی آنزیم (۴) تجمع بیش از حد گلیکوژن و چربی در کبد
- ۶۸- کودکان نابینا، اشیای بزرگ را از طریق کدام فرآیند لمسی ادراک می‌کنند؟
 (۱) ترکیبی (۲) احشایی (۳) شهودی (۴) تحلیلی
- ۶۹- حرکات نامنظم، چرخشی و غیر ارادی مربوط به کدام نوع فلج مغزی است؟
 (۱) آتوتوئید (۲) آتاکسیک (۳) همی پلژیا (۴) اسپاستیک
- ۷۰- بر اساس نتایج تحقیقات، نارسا کنش‌وری در کدام یک از مناطق مغزی در افراد LD کمتر قابل مشاهده است؟
 (۱) قطعه پس‌سری (۲) شکنج آنگولار (۳) پلانیوم گیجگاهی (۴) نیمکره‌ی چپ

روان‌شناسی مرضی و کودکان استثنایی

۵۱- در کدام اختلال روانی، فرد نسبت به اختلال خود از آگاهی برخوردار است؟

(۱) هیستری

(۲) پارانویا

(۳) روان‌گسستگی

(۴) وسواس فکری - عملی

۵۲- الگوی پایدار رفتارهای منفی کارانه، خصومت‌آمیز و گستاخانه در غیاب نقض جدی موازین اجتماعی یا حقوق دیگران ویژگی

اصلی کدام اختلال است؟

(۱) سلوک

(۲) اختلال ارتباطی

(۳) شخصیت ضد اجتماعی

(۴) بی‌اعتنائی مقابله‌ای

- ۵۳ در کدام اختلال فقدان علاقه به اجتماعی شدن به رفتار اجتماعی اجتنابی در فرد منجر می‌شود؟
 (۱) شخصیت اسکیزوئید
 (۲) شخصیت وابسته
 (۳) فوبی اجتماعی
 (۴) شخصیت مرزی
- ۵۴ سوال زیر برای ارزیابی کدام فرآیند روانی در بیماران مبتلا به اختلالات روانی به کار می‌رود؟
 «اگر بوی دود در سینمایی به مشامت چه اقدامی می‌کنی؟»
 (۱) جهت‌یابی
 (۲) قضاوت
 (۳) حافظه
 (۴) هوش
- ۵۵ بر مبنای کدام فرضیه در مورد علت به وجود آمدن اسکیزوفرنیا، وقتی کودک پیام‌های متضادی در مورد رفتار، نگرش‌ها و احساس‌ها از جانب والدین خود دریافت کند با علائم سایکوتیک پاسخ می‌دهد؟
 (۱) وابستگی مضاعف
 (۲) دو سوپه کاذب
 (۳) گسستگی
 (۴) هیجان ابراز شده
- ۵۶ در بیماران مبتلا به افسردگی، کدام تغییر منجر به کاهش افسردگی می‌شود؟
 (۱) کاهش خواب REM
 (۲) افزایش خواب REM
 (۳) کاهش زمان نهمتگی REM
 (۴) مصرف مقادیر زیاد آل - تریپتوفان
- ۵۷ اولین گام در تعیین درمان برای کودک یا نوجوانی که رفتار ضد اجتماعی نشان می‌دهد، کدام است؟
 (۱) درمان اختلالات روانی همایند
 (۲) ارائه تقویت منفی
 (۳) کنترل محیط
 (۴) پاداش برای رفتار مناسب
- ۵۸ کدام عبارت در مورد «رت» تلال صحیح است؟
 (۱) هم در پسران و هم دختران دیده می‌شود و شیوع آن در هر دو جنس یکسان است.
 (۲) در پسران دو برابر دختران شیوع دارد.
 (۳) در پسران چهار برابر ن شیوع دارد
 (۴) فقط در دختران دیده می‌شود و جز اختلالات فراگیر رشد است.
- ۵۹ گذار از ۱۸ خند تعمیم یافته به اضطراب در کدام مرحله از مراحل تحول بهنجار مارگارت ماehler صورت می‌گیرد؟
 (۱) جدایی
 (۲) همزیستی
 (۳) درخودماندگی بهنجار
 (۴) تفرد
- ۶۰ کدام نکته در تشخیص تراقی «آسپرگر» از «آتیسیم» مفید است؟
 (۱) فقدان تاخیر تحول زبان
 (۲) سن شروع پس از ۴ تا ۵ سال
 (۳) اختلال تماس
 (۴) رفتار تکراری
- ۶۱ قضاوت بالینی در تشخیص کدام دسته از اختلالات کودکان، اهمیت بیشتری دارد؟
 (۱) جسمانی
 (۲) عقب‌ی ذهنی
 (۳) عاطفی و رفتاری
 (۴) ناتوانی‌های یادگیری
- ۶۲ تصویرسازی ذهنی در براد نابینا بیشتر از طریق کدام حس صورت می‌گیرد؟
 (۱) جنبشی و حرکتی
 (۲) لامسه
 (۳) شنوایی
 (۴) لامسه و شنوایی به میزان تقریباً برابر
- ۶۳ این علائم را در کدام بیمه با عقب‌ماندگی ذهنی است، می‌توان مشاهده کرد: «نقص بینایی، کمی تونوس عضلانی، جثه کودک، عطف عمومی و در اکثر موارد ول عمر کم»؟
 (۱) تائ ساکس
 (۲) کاف
 (۳) لو
 (۴) لش ینهان
- ۶۴ در سندرم پاتو» که همراه با عقب‌گی ذهنی است، علت اختلال در کدام کروموزوم است؟
 (۱) هجده
 (۲) سیزده
 (۳) پنج
 (۴) بیست و یک
- ۶۵ این عبارت توصیف مربوط به کدام نوع فلج مغزی است؟
 «وجود آسیب در دست‌ها و پاها دیده می‌شود، ولی شدت آسیب در پاها بیشتر است.»
 (۱) همی پلژیا
 (۲) پاراپلژیا
 (۳) کوادری پلژیا
 (۴) دی پلژیا
- ۶۶ کدام مورد از ویژگی‌های بارز کودکان تیزهوش است؟
 (۱) ضریب هوشی (IQ) ۱۴۰-۱۳۰
 (۲) خلاقیت
 (۳) ضریب هوشی (IQ) ۱۶۵-۱۴۵
 (۴) ناسازگاری عاطفی

۶۷- کدام بیماری‌ها، ناشی از اختلال در ژن غالب معمولی است که معمولاً همراه با عقب‌ماندگی ذهنی هستند؟

(۱) آنژیوم‌های چهره و مغز - سندرم کروزون ، سندرم ادوارد

(۲) توپروس اسکروز - نورو فیبرو ماتوز، سندرم ادوارد

(۳) سندرم ادوارد، توپروس اسکروز، سندرم کروزون

(۴) توپروس اسکروز، نورو فیبرو ماتوز ، آنژیوم‌های چهره و مغز

۶۸- کدام الگوی رفتاری از ویژگی‌های کودکان دشوار است؟

(۱) معمولاً با دیگران به سختی و خیلی دیر ارتباط برقرار می‌کنند.

(۲) واکنش‌های آنان بیشتر شدید است و حالت منفی دارد.

(۳) هر کاری را که می‌خواهند انجام دهند، آنقدر دنبال می‌کنند تا بالاخره انجام دهند.

(۴) در رفتارهای آنان نظم و ترتیب طبیعی وجود دارد و می‌توان رفتارهای آنان را پیش‌بینی کرد.

۶۹- تفاوت اساسی بین تعریف جدید عقب‌ماندگی ذهنی توسط انجمن عقب‌ماندگی ذهنی آمریکا، در مقایسه با تعریف قبلی آن

کدام است؟

(۱) تأکید بر عملکرد پایین‌تر از متوسط فرد

(۲) اهمیت داد به رفتارهای سازشی فرد

(۳) تأکید بر ویژگی‌های فردی

(۴) ظاهر شدن مشکلات در دوران رشد

۷۰- علت ایجادکننده ناشنوایی انتقالی کدام است؟

(۱) امراض عفونی

(۲) نقش در پرده گوش

(۳) مسمومیت دارویی

(۴) نقص در استخوان‌های سه گانه گوش

روان‌شناسی مرضی و کودکان استثنایی:

- ۶۶- در مقایسه با بزرگسالان، کودکان علائم اختلال‌های روانی را بیشتر به کدام شکل نشان می‌دهند؟
 (۱) پنهان (۲) درونی شده (۳) خفیف (۴) جسمانی
- ۶۷- براساس دسته‌بندی حوزه دید، کدام طبقه از دانش‌آموزان با آسیب بینایی حوزه دید محدودی دارند و نیازمند آموزش ویژه هستند؟
 (۱) دوربین عادی (۲) نزدیک‌بین عادی (۳) کم‌بینای خفیف (۴) کم‌بینای نیمه‌شدید
- ۶۸- متخصصان گستره آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه در توصیف آموزشی از آسیب بینایی بیشتر بر چه تغییری تأکید دارند؟
 (۱) حس بینایی (۲) میدان دید (۳) میزان خواندن (۴) تیزبینی
- ۶۹- کدام گزینه در مورد کودکان با آسیب شنیداری طبقه «افت شنوایی شدید ۷۰-۹۰ dB HL» صحیح است؟
 (۱) فقط با کاشت حلزون، رشد ادراک شنیداری و تولید گفتار را به دست می‌آورند.
 (۲) قادر به دریافت محرک گفتاری بدون استفاده از پروتز حلزون شنوایی نیستند.
 (۳) زمانی قادر به شرکت در محاوره هستند که واژه‌ها با صدای بلند فریاد زده شوند.
 (۴) فقط با تربیت شنیداری کلامی، رشد ادراک شنیداری و تولید گفتار را به دست می‌آورند.
- ۷۰- عبارت «کشیدگی عضلانی تمام بدن را در بر می‌گیرد و معمولاً در زمان بیداری افزایش و در زمان خواب کاهش می‌یابد» توصیف‌کننده کدام نوع فلج مغزی است؟
 (۱) آتاکسیک (۲) دیس‌کینتیک (۳) آنتونید (۴) دوشن
- ۷۱- در کدام‌یک از اختلالات حرکتی گفتار، مشکلات گفتاری در حد متوسط است، مخرجه آسیب دیده، سرعت گفتار کم و زمان‌بندی و هماهنگی بین اجزای گفتار با مشکل همراه است؟
 (۱) دیس آرتری فلسید (۲) دیس آرتری مختلط
 (۳) دیس آرتری آتاکسیک (۴) دیس آرتری دیس‌کینتیک
- ۷۲- کودکی قادر است با استفاده از سمعک و توانبخشی شنیداری کلامی زبان شفاهی را فرا گرفته و به مدرسه عادی برود. حداکثر افت شنوایی در این کودک کدام است؟
 (۱) شدید (۲) متوسط (۳) متوسط به شدید (۴) خفیف
- ۷۳- در بیشتر موارد، ناروانی طبیعی گفتار در چند ماهگی شروع می‌شود؟
 (۱) ۱۸ (۲) ۲۴ (۳) ۳۶ (۴) ۴۸
- ۷۴- اگر دانش‌آموزی بتواند از بین مجموعه لغات ارائه شده موردی را که تک است و با دیگران متفاوت است، پیدا کند دارای چه مهارتی از آگاهی واجی است؟
 (۱) امتزاج واجی (۲) تقطیع واجی (۳) حذف واجی (۴) طبقه‌بندی اصوات

- ۷۵- برای درمان اختلال کمبود توجه / بیش‌فعالی استفاده از کدام دسته دارویی رایج‌تر است؟
 (۱) محرک‌ها (۲) آرامبخش‌ها (۳) ضد افسردگی (۴) مهارکننده‌ها
- ۷۶- حافظه فعال دیداری فضایی کدام گروه، ضعیف و نیازمند مداخله است؟
 (۱) اختلال خواندن و ایتسم (۲) اختلال نقص توجه / بیش‌فعالی و ایتسم
 (۳) اسپرگر و اختلال نقص توجه / بیش‌فعالی (۴) کنش پریشی و اختلال نقص توجه / بیش‌فعالی
- ۷۷- به اختلال و یا ناتوانی در صحبت کردن یا فقدان درک تکلم که در اثر ضایعات مغزی اکتسابی به‌وجود می‌آید چه گفته می‌شود؟
 (۱) آلابیا (۲) آپراکسیا (۳) آنارثریا (۴) آفازیا
- ۷۸- مشکلات یادگیری به کدام دلیل می‌تواند به تشخیص اختلال یادگیری بیانجامد؟
 (۱) اختلالات هیجانی (۲) نقص بینایی و شنوایی
 (۳) نقص حرکتی (۴) اشکال در پردازش روان‌شناختی
- ۷۹- فرضیه زورگویی تبیین‌کننده کدام اختلال است؟
 (۱) سلوک (۲) آتش افروزی (۳) ضد اجتماعی (۴) بی‌اعتنایی مقابله‌ای
- ۸۰- براساس معیارهای DSM-5، اگر نوجوانی به مدت سه سال دچار علائم افسردگی باشد و در ابتدای سال دوم و سوم بیماری به مدت یک ماه حالت افسردگی‌اش بهبود یافته باشد، کدام تشخیص در مورد او صحیح‌تر است؟
 (۱) اختلال افسردگی اساسی (۲) اختلال افسردگی دائم
 (۳) افسرده‌خویی (۴) اختلال بی‌نظمی خلقی اختلال‌گرا
- ۸۱- در مدل کردار شناختی - عصبی، عامل وسواس در کودکان کدام است؟
 (۱) استرس (۲) ترشح سروتونین (۳) جابجایی رفتار (۴) شرطی‌سازی
- ۸۲- شکست در یادگیری زبان علی‌رغم داشتن هوش طبیعی، فقدان هرگونه مشکل نورولوژیکی، عاطفی یا اجتماعی مربوط به اختلال یا نقص در کدام یک است؟
 (۱) زبان دریافتی (RLD) (۲) زبان خاص (SLI)
 (۳) زبان اولیه (PLI) (۴) زبان رشدی (DLI)
- ۸۳- کودکانی که بیش از حد درباره امور درسی و آینده نگران و معمولاً عصبی و پریشان هستند، به کدام اختلال مبتلا هستند؟
 (۱) اضطراب فراگیر (۲) اضطراب حاد (۳) وسواس (۴) ترس از مدرسه
- ۸۴- وقتی در یک کودک، یادگیری و اجرای مهارت‌های حرکتی با توجه به سن تقویمی وی به‌طور قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر از حد انتظار است، احتمال کدام اختلال مطرح است؟
 (۱) سندرم پاهای بی‌قرار (۲) هماهنگی رشدی (۳) حرکات کلیشه‌ای (۴) لجبازی و مقابله‌گری
- ۸۵- ناتوانی پایدار برای صحبت کردن در برخی موقعیت‌های اجتماعی خاص که ناشی از ندانستن یک زبان یا دشواری در صحبت کردن نیست، اشاره به کدام اختلال دارد؟
 (۱) اوتیسم (۲) لالی انتخابی (۳) اختلال زبان (۴) اضطراب اجتماعی